Klinische Funktionsanalyse (4)

dentaConcept®

Testpat, Tesa — Patient/in
12.10.2011 — Datum
Wagner
0001 — Patienten-Nummer
01.01.1980 — Geburtsdatum
Praxis-Stempel

Life-Event-Scale

Übertrag aus dem Fragebogen Streßbelastung:

Punkte

Die Streßbelastung ist demnach:

- ◯ extrem (≥ 200 Punkte)
- ◯ erhöht (≥ 100 Punkte)
- ◯ normal (< 100 Punkte)

Orthopädische Befunde

Haltung:

seitlich



frontal



Ligamentäre Schwäche positiv ☐

HWS:

Rotationseinschränkung in...



Parafunkt. Befunde

- ☐ Zungenindentationen
- ☐ Wangenveränderungen
- ☐ deutliche Abrasionen
- ☐ keilförmige Defekte
- ☐ Rezessionen
- ☐ McCallsche Girlanden
- ☐ Stillman-Spalten
- ☐ Zahnlockerungen

Palpationsbefunde / Isometrie



rechts		Mißempfindung	Schmerz		links
☐	☐	M. masseter superfic.	☐	☐	
☐	☐	M. masseter prof.	☐	☐	
☐	☐	Kiefergelenk lateral	☐	☐	
☐	☐	Kiefergelenk dorsal	☐	☐	
☐	☐	M. temporalis ant.	☐	☐	
☐	☐	M. temporalis med./post.	☐	☐	
☐	☐	Suboccip.-/Nacken-M.	☐	☐	
☐	☐	M. trapezius	☐	☐	
☐	☐	M. sternocleidomastoideus	☐	☐	
☐	☐	infrahyoidale M.	☐	☐	
☐	☐	suprahyoidale M.	☐	☐	
☐	☐	M. pterygoideus med.	☐	☐	
☐	☐	M. digastricus venter post.	☐	☐	
☐	☐	M. pteryg. lat. / Isometrie	☐	☐	



Gelenkgeräusche



Knackgeräusch

rechts	links
◯ kurz, hart	◯ kurz, hart
◯ weich	◯ weich

Kompression verändert Zeitpunkt

rechts	links
◯ früher	◯ früher
◯ nicht	◯ nicht
◯ später/nicht mehr	◯ später/nicht mehr

Mobilitäts- und klinische Okklusionsbefunde

Öffnung UK



SKD max. **aktiv** ____ mm ☐ Mißempf. ☐ Schmerz

SKD max. **passiv** ____ mm ☐ Mißempf. ☐ Schmerz

Endgefühl ◯ weich ◯ hart

Overjet (horiz.) ____ mm

Overbite (vert.) ____ mm

Protrusion ____ mm ☐ Mißempf. ☐ Schmerz

Laterotrusion **rechts** ____ mm ☐ Mißempf. ☐ Schmerz

Laterotrusion **links** ____ mm ☐ Mißempf. ☐ Schmerz

Gleitweg in **zentrische Relation** ____ mm ☐ Mißempf. ☐ Schmerz

...wenn > 0: **Gleitweg**
- ◯ sagittal
- ◯ Abweichung rechts
- ◯ Abweichung links

Habituelle Okklusion:

◯ stabil ◯ instabil

- ☐ Frontzähne in Kontakt
- ☐ Seitenzähne außer Kontakt
- ☐ Sprechabstand nicht ausreichend

Unphysiol. Okklusionskontakte

- ☐ habituell .....
- ☐ zentrisch .....
- ☐ protrusiv .....
- ☐ laterotrusiv ▸ re. .....
- ☐ laterotrusiv ▸ li. .....

(betr. Zähne)

Reaktionstests

Provokationstest (Krogh-Poulsen, Isometrie)

◯ pos. ◯ neg. ..... Ausführung

Resilienztest nach Gerber:

rechts	Shimstock	links	Shimstock
links mm	fixiert bei Zinnfolie	rechts mm	fixiert bei Zinnfolie
◯ Kompression		◯ Kompression	
◯ neutral		◯ neutral	
◯ Distraktion		◯ Distraktion	

Auswertung

Initialdiagnose(n): .....

.....

.....

Nebendiagnose(n): .....

Differentialdiagn.: .....

Konsile

- ☐ Psychosomatik
- ☐ Orthopädie
- ☐ Physiotherapie
- ☐ RÖ, CT, MR, Sono
- ☐ andere: .....
- ☐ zahnärztl. instrumentelle Funktionsanalyse / Okklusionsanalyse

Kontrollausdruck gedruckt mit CMDfact®

Entwicklung: OA Dr. M. O. Ahlers, Prof. Dr. H. Jakstat, Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg 1996-2000, Version 2.51